

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ

Инфекционные болезни очень опасны для маленьких детей, ведь их организм еще не способен эффективно бороться с возбудителями. Поэтому необходимость проведения профилактических прививок несомненна. Но всем ли детям прививки пойдут на пользу? Чего нужно остерегаться родителям и как правильно подготовить ребенка к прививке?

Что же представляет собой вакцина?

В них используются мертвые или ослабленные микроорганизмы, которые стимулируют выработку иммунной системой соответствующих антител. Эти антитела и защитят ребенка от инфекции, если в организм попадут микробы опасного заболевания. Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок проводится зарегистрированными и разрешенными к применению вакцинами отечественного и зарубежного производства. В некоторых поликлиниках в наличии имеются платные импортные вакцины, не входящие в систему ОМС (обязательного медицинского страхования). Они более очищены от примесей и легче переносятся ребёнком.

Как подготовить ребенка к прививке?

Ко всем прививкам, независимо от времени проведения, нужно готовиться: в течение двух недель до и после вакцинации необходима гипоаллергенная диета, детям грудного возраста не стоит вводить новый прикорм. Также рекомендуется за три дня до прививки, утром в день прививки и три дня после прививки нужно давать ребёнку противоаллергический препарат в профилактической дозе.

Накануне проведения прививки необходимо убедиться, что температура у ребенка нормальная - 36,6 градусов С. Особо отметим, что у грудничков нормальной считается температура до 37,2 градусов. В день проведения прививки ребенка осматривает педиатр. Приготовьтесь ответить на его вопросы:

- не повышалась ли у ребенка в последние дни температура;
- не простужен ли ребенок, нет ли у него насморка или кашля;
- какие препараты принимал ребенок в последние 3 месяца (особенно важно сообщить врачу о препаратах, изготовленных на основе крови);
- не делали ли ему переливания крови;
- какие хронические заболевания выявлены.

Только при отсутствии противопоказаний малышу делаются прививки.

Как вакцинация влияет на состояние ребенка?

После проведения прививок в ряде случаев возможно развитие поствакцинальных реакций. Поствакцинальные реакции могут быть общими и местными. Общие реакции выражаются в умеренном повышении температуры и легком недомогании. Местные реакции проявляются болезненностью, покраснением и легкой припухлостью в месте инъекции.

Как местные, так и общие поствакцинальные реакции непродолжительны по времени (1-2 дня) и хорошо переносятся ребенком. В связи с этим маме рекомендуют пронаблюдать за состоянием ребенка после проведения прививки и в течение 2 дней контролировать температуру тела.

Необычной и неадекватной реакцией на прививку считаются:

- высокая температура (выше 38,5 °С);
- тяжелое общее состояние ребенка;
- аллергическая реакция в виде сыпи, отека лица, судорог;
- уплотнение, опухоль, нагноение в месте инъекции.

В этих случаях необходимо срочно вызвать врача.

Противопоказания к проведению вакцинации

К детям, имеющим какие-либо хронические заболевания, страдающим аллергией или с ослабленным иммунитетом, нужен индивидуальный подход. Для них рекомендована консультация иммунолога или врача-специалиста, но, в любом случае, вакцинация необходима и таким детям.

Во время тяжелого или обострения хронического заболевания прививку откладывают до выздоровления. При аллергии прививки проводят только спустя месяц после окончания обострения. Не прививают ребенка и в период сезонной аллергии (например, в период цветения растения-аллергена).